



中国鸟类观察

China Bird Watch

第五期 Issue 5

Jan 1, 2001

最新消息 The Latest News

China's First Raptor Rescue Center Opens

(Beijing, China-14 December 2001) China's first specialized rescue and rehabilitation center for birds of prey officially starts operation today in Beijing. Funded by the International Fund for Animal Welfare (IFAW - www.ifaw.org) and located on the campus of Beijing Normal University (BNU), the Beijing Raptor Rescue Center (BRRC) is a not-for-profit center aiming to promote the highest standards of animal welfare by incorporating up-to-date technology and best animal husbandry techniques to rescue, care, rehabilitate and release wild raptors. The Beijing Raptor Rescue Center has received certification from the Beijing Forestry Bureau as its "designated raptor rescue facility".



Eurasian Eagle Owl being cared for at the Beijing Raptor Rescue Center. Photo: IFAWB, Callahan

For more information, please check: IFAW China Office <http://www.ifaw.org>

全国首家猛禽救助中心在京落成 中美专家将联手救助受伤的濒危猛禽

“濒危受伤猛禽有家了！”昨天，笔者从国际爱护动物基金会获悉，我国第一家猛禽救助中心日前在北京师范大学落成，中美专家将首次联手救助受伤的濒危猛禽。据野生动物专家介绍，北京地处许多濒危鸟类的迁徙路线上，一些鸟贩子为谋取暴利，对一些受国家保护的野生鸟类进行非法捕捉、贩卖和走私，经常使一些鸟类受伤得不到医治。新落成的北京猛禽救助中心是北京市野生动物保护及自然保护区管理站、北京师范大学和国际爱护动物基金会共同开展的项目。该项目致力于通过将现代科技和管理技术运用于在北京受伤猛禽的救助、康复及放归工作，努力推广野生动物护理的最高标准。市野生动物保护站站长王民中介绍，中美两国野生动物救助专家因此还将首次进行联手救助受伤猛禽，更好地保护好野生濒危鸟类。目前，他们已组成一个专家组前往美国加利福尼亚的两个猛禽救助中心，与美国野生动物救护专家进行知识与技术交流。

《北京日报》2001年12月 记者李琦

乌鸦

我们日常所见的乌鸦共有三种，分别为秃鼻乌鸦、小嘴乌鸦和大嘴乌鸦。它们均属雀形目、鸦科、鸦属。

秃鼻乌鸦又名老鸱，学名 *Corvus frugilegus*，英文名 Rook。体型略大（47 厘米）的黑色鸦。特征为嘴基部裸露皮肤浅

灰白色。幼鸟脸全被羽，易与小嘴乌鸦相混淆，区别为头顶更显拱圆形，嘴圆锥形且尖，腿部的松散垂羽更显松散。飞行时尾端楔形，两翼较长窄，翼尖“手指”显著，头显突出。虹膜一深褐；嘴一黑色；脚一黑色。叫声：比小嘴乌鸦叫声更枯涩乏味的 kaak 声。也发高而哀怨的 kraa-a 及其他叫声。鸣声为多种令人生畏的声响的组合包括咯咯声、啊啊声及怪异的咔哒声等，伴以头部的前后伸缩动作。分布范围：欧洲至中东及东亚。分布状况：过去曾常见，现数量已大为下降。习性：进食及营巢都结群的社群性鸟种。常与寒鸦混群。取食于田野及矮草地。常跟随家养动物。

小嘴乌鸦学名 *Corvus corone*，英文名 Carrion Crow。体大（50 厘米）的黑色鸦。与秃鼻乌鸦的区别在嘴基部被黑色羽，与大嘴乌鸦的区别在额弓较低，嘴虽强劲但形显细小。虹膜一褐色；嘴一黑色；脚一黑色。叫声：发出粗哑的嘎嘎叫声 kraa。分布范围：欧亚大陆、非洲东北部及日本。习性：喜结大群栖息，但不像秃鼻乌鸦那样结群营巢。取食于矮草地及农耕地，以无脊椎动物为主要食物，但喜吃尸体，常在道路上吃被车辆压死的动物。一般不像秃鼻乌鸦那样栖于城市。

大嘴乌鸦又名老鸱、乌鸦，学名 *Corvus macrorhynchos*，英文名 Large-billed Crow。描述：体大（50 厘米）的闪光黑色鸦。嘴甚粗厚。与小嘴乌鸦的区别在嘴粗厚而尾圆，头顶更显拱圆形。虹膜一褐色；嘴一黑色；脚一黑色。叫声：粗哑的喉音 kaw 及高音的 awa, awa, awa 声；也作低沉的咯咯声。分布范围：伊朗至中国、东南亚、菲律宾、苏拉威西岛、马来半岛及巽他群岛。分布状况：中国除西北部外的大部地区的常见留鸟。习性：成对生活，喜栖于村庄周围。

来自中国物种信息系统 CSIS www.chinabiodiversity.com



What to do if you find a baby bird?

If the young bird is hopping and running away from you, let it be. Its parents will find it.

If the bird is in danger of becoming lunch for a cat or dog, scoop it up and place it in a nearby bush or shrub out of harm's way. Since most birds have no significant sense of smell, moving the baby bird to safety or returning it to the nest will not cause the parents to abandon it.

If the bird has little or no feathers and you can find the nest, return the bird to its nest.

If the baby/fledgling is cold to the touch, take it inside to warm before returning to the nest. Nestle the bird in a warm towel or

use a hot water bottle (with a towel between the bird and the bottle). Place the bird in a warm, dark, quiet room away from children and pets.

Do not attempt to feed babies or fledglings.

If the nest has been destroyed, you can create a makeshift nest using a small basket or a Cool Whip container. Line the container with material from the old nest or with dry grass and leaves. Wire your nest to a branch or place it securely in a branch fork near the old nest. Be sure there are holes in the bottom of the container to allow drainage.

If you cannot find the nest or if the bird appears to be sick, injured, or needs feeding, call a local wildlife rehabilitator like the one who will be at the April meeting!

For more information, please check:

Mecklenburg Audubon Society <http://www.meckbirds.org>

枯藤老树觅无处 乌鸦大军何时撤出沈阳

最近几天,每当夜幕降临,近万只乌鸦就准时飞临沈阳市中山公园附近的楼宇之间,或在天空中自由飞翔,或在楼顶上悠然散步,夜晚就栖息在树枝、楼顶上。清晨,鸦去树空。面对这群不速之客,受尽鸟粪之苦的居民和环卫工人,在尝试各种方法驱赶乌鸦失败后,习惯了与乌鸦和平共处。鸟类专家指出,什么时候城市周围的生态环境改善了,乌鸦才会从城市里撤退。

昨日下午4时,记者在南京街看到马路上随处可见乌鸦粪便的痕迹,有的还能分辨出扫帚印。和平区环卫局第三清洁作业公司刘爱华书记谈起乌鸦时连连叹气。她说乌鸦主要集中在南京街北一马路至中华路这一段。这几年一年比一年多,鸟粪也越来越多。每天清扫的乌鸦粪便有50公斤之多。

一位环卫工人说,夜扫每天凌晨3时30分开始。每当进入乌鸦聚集的“雷区”,环卫工人都得轻点扫,生怕惊扰了熟睡中的乌鸦。不然的话,成千上万的乌鸦腾空而起,白色的粪便就会像雨点一样落下来,落在环卫工人的头、脸和衣服上面。可是不管怎样小心,衣服上都会粘上乌鸦的粪便,每天清洗工作服是免不了的。一位住在同泽北街中山大厦附近的王大妈说:“窗户、阳台上常有乌鸦的粪便。”

沈阳市野生动物保护管理站站长助理王志丰告诉记者,乌鸦是国家二级保护动物,管理站对南京街的乌鸦已经密切关注两年了。他说,乌鸦天性喜欢在高大的乔木筑巢、栖息,如果树木高度低于20米,乌鸦就会离开。近年来,沈阳市周边地区高大乔木被砍伐得厉害,树木高度整体下降。乌鸦过冬天还有群居的习性,所以越来越多的乌鸦把“家”安在了钢筋混凝土之上。今年移居沈阳的乌鸦约有一万只,比去年多出一倍。

只有环境好转了,乌鸦才会撤出城市,重回大自然的家园,靠人工驱逐几乎是不可能的。

2001年12月4日 辽沈晚报 记者侯悦林

假期到了,观鸟去啦!

——元旦春节寒假的可行方案

- 1、东洞庭湖观鸟(3天假期的行程,已有成熟方案);
 - 2、黄河三角洲观鸟、露营观黄河口日出、乘船沿黄河入海(周末2天,已有成熟日程);
 - 3、鄱阳湖观鸟(5天的行程,已有成熟方案);
 - 4、升金湖—桃红岭观鸟、观野生梅花鹿、负重爬山、认识植物(3-4天行程,升金湖有实践,桃红岭待开辟);
 - 5、连康山穿越、大别山红色之旅(周末或延1-2天,观鸟有现成方案,徒步穿越尚无实践,但听说有人走了两天);
 - 6、宝天曼生态游(3-4天行程,待设计,已建立联系)。
- 注:第5可在4月初,第6可在5月,但冬天都有特点。以

上都是从北京出发南下的方案,其实更适合南方朋友。

详细方案可浏览WWF China网站

<http://www.wwfchina.org/bbs/guanniao.htm>

新址通知

中国鸟类观察暨中国野鸟解放阵线

地址:北京市海淀区西郊宾馆康乐中心三层生动中心内

电话:86-10-62322288 ext 5839

通信地址:北京邮政100102-20信箱 邮编:100102

电子邮件:chinabirding@hotmail.com

China Bird Watch / China Wild Bird Liberation Front

Beijing Xi Jiao Hotel, 3rd Floor Recreation Center

No.18 Wang Zhuang Road, Haidian District

Beijing 100083, China

Postal Address: Beijing P.O.Box 100102-20

特别感谢:北京西郊宾馆康乐中心生动健身俱乐部

Jade Gray先生和洪卫国先生 无偿提供办公地点!

小知识——鸟类的野外识别

目前,全世界共有8600多种鸟类,中国就占有1186种。欲正确地识别各种鸟类,不但要查阅有关书籍和标本资料,更重要的是要去野外观察它们的羽色和行为。在野外,我们可以根据四个方面去识别。

1. 羽色 根据羽色,可以把你所在地区常见鸟类分成若干类。比如,鸟羽以黑色为主的有家燕、雨燕、八哥、乌鸦、黑卷尾、鸬鹚等;以白色为主的有天鹅、白鹭、海鸥、等;以褐色为主的有百灵、画眉、三道眉草鸥、麻雀等;以绿色为主的有黄雀、柳莺、绿孔雀等。有一点应该提醒大家,鸟类适应气温的变化,一年当中要换两次羽毛,绝大多数种类,换羽前后羽色没有明显差别,但是个别种类如雷鸟,生活在我国东北,春天羽色为棕黄色带暗色横斑;盛夏羽色变成栗褐色;深秋羽色为带有黑色块斑的暗棕色;严冬羽色则为白。这是鸟类和很多其他动物在大自然中生存的一种适应性。

2. 叫声 鸟类大多胆怯怕人,常隐蔽在枝叶茂密的树上或稠密的草丛中,往往只闻其声,不见其身。鸟类的鸣声,是辨别种类的主要方法之一,欲熟悉和掌握常见种类的叫声就需经常去野外反复细心倾听,把它们的叫声,包括惊叫声、求偶声等,用录音机记录下来,可以反复收听,加强记忆。

3. 形态特征 有些鸟类具有显著的形态特征,可以帮助我们区别种类,如扁嘴、短腿的是鸭类;长嘴、长脚的,可能是鹤类、鸕类或鹳类;嘴很长,约占体长1/5的大鸟,一定是鸬鹚;嘴大,上面长有盔突的是犀鸟;体型不大,通体黑色,尾较长且外侧尾羽向上卷曲的是卷尾鸟。

4. 生活习性 各种鸟都有它们的不同生活习性。喜欢直线飞行的鸟有野鸭、天鹅、杜鹃、乌鸦等;盘旋飞行的是鹰类;波浪式飞行的鸟有啄木鸟、戴胜;飞行速度极快而又常改变方向的有雨燕;草原上有种鸟叫云雀,它常往高空飞,而且边飞边叫;沿溪流飞行的红色长嘴的绿色小鸟,往往是翠鸟;伯劳有独特的取食习性,它们常停在树枝上待飞虫过境起捕捉,然后返回原处啄食;在悬崖峭壁营巢的多数是鹰类;在水中造浮巢的是鸬鹚;把两片大叶子和在一起做巢的是缝叶莺;用草茎或纤维做成蒸馏瓶形挂巢的是织布鸟等等。另外,鸟类的食性不同导致它们的身体结构也相应有所不同。如,食鱼虾的鸟类,嘴形大多长阔而尖锐,如鹭、鸕;鸭类需要在水中游泳觅食,所以它们脚趾间具蹼,喙缘生有细刻,可随时把水滤出而将食物留在嘴里;啄木鸟由于要从树洞中钩取害虫,舌头长得很长,而且先端生有短钩,平时舌头缠绕在头皮下,用时一下子伸出来;吃植物种子的鸟,它们的喙大多短而坚,利于啄破外壳。另外,鸟类的脚也相应地与所食食物的性质,有统一性的适应。